

הסימנים המוקדמים לאוטיזם מתגלים מגיל 9 עד 16 חודשים



קל להחמיץ את הסימנים המוקדמים לאוטיזם. ניתן לאבחן אוטיזם כבר בגילי 18-24 חודשים, אבל בפועל, הוא לרוב אינו מאובחן עד גיל 4-5 שנים. פיתחנו צ'ק ליסט (רשימת תיג) במטרה לסייע לכם לאתר אוטיזם עוד לפני שהוא בדרך כלל מאובחן.



רשימה זו היא נספח של עלון המידע שלנו, המדגים את 16 הסימנים המוקדמים לאוטיזם המתגלים מגיל 9 עד 16 חודשים. תוכלו לעיין בעלון המידע באתר האינטרנט: [Baby Navigator.com](http://BabyNavigator.com). כמו כן, תוכלו להוריד, לשתף ולהדפיס גרסה בת 8 עמודים של העלון או גרסה בת עמוד אחד שלו המעניקה הצצה למדריך 16 סימנים מוקדמים לאוטיזם עד גיל 16 חודשים.

הנחיות לשימוש בצ'ק ליסט: סמנו כן או לא ליד כל סימן מוקדם לאוטיזם המתאר את התנהגות ילדכם. תוכלו להקליק על השאלות כדי להציג את התמונות הרלוונטיות של הסימנים המוקדמים מתוך עלון המידע. מספר הסימנים המוקדמים יסוכם באופן אוטומטי. כל אחד מהסימנים הללו, אם מופיע לבדו – אינו בהכרח מעיד על בעיה. אולם, הופעה של מספר סימנים יחדיו עשויה להצביע על צורך לערוך בדיקת סינון או הערכה התפתחותית.

שם: _____ תאריך: _____ הגיל בחודשים: _____ ממלא הטופס: _____

צ'ק ליסט של סימנים מוקדמים לאוטיזם

כן לא

1. האם קשה לגרום לתינוקכם להביט בכם?
2. האם תינוקכם ממעט לחלוק איתכם רגעי הנאה?
3. האם תינוקכם אינו מרבה לשתף אתכם בדברים שמעניינים אותו?
4. האם תינוקכם ממעט להגיב לקריאה בשמו או לפניו אחרות לאינטראקציה?
5. האם תינוקכם עושה שימוש מוגבל בג'סטות כגון 'להראות' ו'להצביע'?
6. האם תינוקכם מתקשה להביט בכם תוך כדי שימוש בג'סטות ובקולות?
7. האם תינוקכם כמעט ואינו מחקה אחרים או אינו מחקה כלל, או לא משחק במשחקי "כאילו"?
8. האם תינוקכם משתמש בידכם ככלי?
9. האם תינוקכם מפגין עניין רב יותר בחפצים מאשר באנשים?
10. האם תינוקכם מניע את האצבעות, הידיים או הגוף בדרכים לא שגרתיות?
11. האם תינוקכם חוזר על תנועות לא שגרתיות עם חפצים?
12. האם תינוקכם מפתח טקסים ומפגין כעס ועצבנות בתגובה לשינויים?
13. האם תינוקכם מפגין עניין מוגבר בפעולות או בחפצים מסוימים?
14. האם תינוקכם ממוקד מאוד בחפצים לא שגרתיים או נקשר אליהם?
15. האם תינוקכם מגיב באופן לא שגרתי לקולות, מראות או מרקמים?
16. האם תינוקכם מפגין עניין מוגבר בחוויות חושיות לא טיפוסיות?

סה"כ סימנים מוקדמים לאוטיזם:

מה לעשות אם ילדכם מראה חלק מהסימנים המוקדמים לאוטיזם?

אם ילדכם מראה 4 או יותר מהסימנים המוקדמים שתוארו בצ'ק ליסט, השתמשו **בבדיקת התקשורת החברתית שלנו** Social Communication Checkup – SoCo עבור תינוקות בני 18-9 חודשים, לביצוע בדיקת סינון לאוטיזם. הטופס זמין באינטרנט ללא עלות.
אם ילדכם מראה 8 או יותר מהסימנים המוקדמים שתוארו בצ'ק ליסט, בקשו מרופא הילדים הפניה להערכה התפתחותית.

פנו לרופא הילדים או לצוות הגן, ודברו איתם על כל אחד מהסימנים המוקדמים הללו, וצרו צרו קשר עם המכון להתפתחות הילד במקום מגוריכם. שתפו את הצ'ק ליסט הזה איתם.